

La vaccinazione antinfluenzale in Trentino

Dati del sistema di sorveglianza PASSI e dell'APSS (anni 2011-2014) — a cura dell'Osservatorio per la salute P.A.T.

L'INFLUENZA generalmente è una malattia lieve e la maggior parte delle persone guarisce rapidamente. Tuttavia, l'influenza a volte può essere molto grave fino a provocare la morte.

Il modo più efficace e sicuro per prevenire l'influenza e le sue complicanze è la **VACCINAZIONE**.

Il Ministero della Salute pone per le persone a rischio un **obiettivo di copertura minimo del 75% e ottimale del 95%**.


Le **PERSONE A RISCHIO** di complicanze gravi sono:

- ✓ **gli ultra 64enni**, poiché il sistema immunitario si indebolisce con l'età e diventa meno efficace nel combattere le infezioni
- ✓ **le persone affette da una patologia cronica** come diabete, insufficienza renale, malattie respiratorie e cardiovascolari, tumori che più frequentemente vanno incontro a complicanze e ospedalizzazione
- ✓ **le donne in gravidanza**, in quanto inclini a influenza grave con possibili complicanze anche per il feto

Inoltre **il personale sanitario**, essendo quotidianamente esposto ha maggior rischio di contrarre l'influenza e di trasmetterla a gruppi di persone vulnerabili.

COPERTURA VACCINALE NEGLI ADULTI (18-64 anni)


● Italia
 ● Trentino



portatori di patologie croniche



popolazione senza patologie croniche



popolazione generale

dati PASSI 2011-2014

Secondo i dati autoriferiti nell'indagine PASSI, **in Trentino** si vaccina contro l'influenza stagionale il **6%** della popolazione in età 18-64 anni.

La prevalenza sale al **16%** per le persone che si dichiarano affette da almeno una patologia cronica, alle quali la vaccinazione è fortemente raccomandata, ma resta in ogni caso molto lontana dall'atteso.

I valori provinciali di copertura sono significativamente inferiori a quelli medi nazionali.


COPERTURA VACCINALE NEGLI ADULTI 18-64 ANNI PER REGIONE DI RESIDENZA



■ peggiore rispetto al valore nazionale
■ simile rispetto al valore nazionale
■ migliore rispetto al valore nazionale

dati PASSI 2011-2014

COPERTURA PER CAMPAGNA VACCINALE



L'APSS annualmente rileva la copertura vaccinale antinfluenzale nelle persone che per le loro condizioni personali corrono un maggior rischio di complicanze nel caso contraggano l'influenza.

In particolare le persone tra i 6 mesi e i 64 anni affette da almeno una **patologia cronica** (identificate sulla base degli elenchi di esenzione ticket per patologia, popolazione diversa da quella indagata dal sistema PASSI) e gli **anziani** a partire dai 65 anni.

La copertura provinciale dell'ultima **campagna vaccinale 2014-15**

✓ per gli **ultra 64enni** è pari al 52%, con un trend in continuo calo (meno dieci punti percentuali rispetto alla campagna 2011-12)

✓ per le persone adulte affette da **patologia cronica** è pari al 25%, in calo rispetto alle campagne precedenti

✓ per i **bambini** tra i 6 mesi e i 14 anni è pari al 32%, con una flessione rispetto alle campagne precedenti.

- ITALIA : ultra 64enni
- TRENTINO : ultra 64enni
- TRENTINO : portatori patologie croniche 6 mesi-14 anni
- TRENTINO : portatori patologie croniche 18-64 anni

Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze è necessario raggiungere elevate coperture vaccinali nei gruppi di popolazione a rischio.

Il **2 novembre** sono iniziate le vaccinazioni contro l'influenza offerte gratuitamente alle persone di età pari o superiore a **65 anni**, alle persone affette da **patologie croniche** e alle donne che sono nel secondo o terzo trimestre di **gravidanza**.

Il vaccino è raccomandato anche al **personale sanitario** e a chi svolge funzioni di assistenza. La vaccinazione, inoltre, è proposta

e somministrata gratuitamente alle **Forze di pubblica sicurezza, Vigili del fuoco**, personale della **Protezione civile** e al personale che per motivi di lavoro ha contatto con animali come **veterinari, allevatori** e addetti al trasporto di animali.

Le persone interessate possono vaccinarsi negli ambulatori vaccinali dei distretti sanitari o dal proprio medico di famiglia.

È consigliato vaccinarsi entro la fine del mese di novembre.

